

BETEGTÁJÉKOZTATÓ az intravitreális injekciót adását követő teendőkről

Tisztelt Betegünk!

A mai napon a szem belsejébe injekciót kapott. Az injekció beadását követően mindennapi normál életét élheti: háztartást vezethet, dolgozhat, televíziót nézhet.

A következő napokban az alábbiakra kell figyelnie:

Az intravitreális injekció beadását követő három napon keresztül ne dörzsölje szemét, ne menjen uszodába.

A beavatkozást követő első napon:

- Az injekció beadása előtt alkalmazott fertőtlenítő szer izgathatja szemét. A szem ezért átmenetileg bevörösödhet, szúrásérzése lehet. A fertőtlenítő kezelést igénylő valódi allergiás reakciót rendkívül ritkán vált ki. A panaszok a legtöbb esetben egy-két napon belül önmaguktól megszűnnek.
- Az injekció beadását követően előfordulhat, hogy szeme előtt úszkáló homályok jelennek meg. Ezt a gyógyszer cseppjei okozzák. Hasonlóan a szemvörösséghez, ezek a panaszok is néhány napon belül kezelés nélkül elmúlnak.
- Előfordulhat, hogy a szúrás helye körül kis kötőhártyavérzés alakul ki. Ezt Ön a szemrés területében észlelhető körülírt, fájdalomtalan vörösség formájában észlelheti. Bár az elváltozás első pillanatra ijesztőnek látszik, valójában egy veszélytelen, egy-két hét alatt spontán felszívódó elváltozásról van szó.

A beavatkozást követő első 10 napban:

Az injekció beadását követően kialakuló fertőzés kockázata meglehetősen kicsi, mintegy 2 ezrelék. Ha azonban ez a szövődmény mégis fellép, az azonnali, erélyes kezelést igényel. Fontos ezért, hogy ha az alábbi tüneteket érzékeli, mihamarabb jelentkezzen osztályunkon:

- Látásromlás: A fertőzés korábbi látáspanaszain túl további, fokozódó látásromlást okoz. Az éleslátás helyének megbetegedésével ellentétben azonban a látás romlása nem csupán a centrális látást károsítja, hanem a látótér egészét érinti.
- Vörösség: Amennyiben fertőzés alakul ki, a szem vörössége nem csupán a szúrás helyén észlelhető, hanem a szem egésze erősen bevörösödik.
- Fájdalom: A fertőzőes szövődmény következtében a szem fájdalmassá válik. A beavatkozást követő szúró érzéssel ellentétben azonban ez egy fokozatosan erősödő tompa fájdalom.

Amennyiben a fenti panaszok bármelyikét észleli, kérjük, azonnal telefonáljon osztályunkra. Mondja el, hogy pontosan mikor történt a beavatkozás, és ki adta be az injekciót. Ügyeletes orvosunk rövid időn belül visszahívja, és megbeszéljük a további teendőket.

Éjjel-nappal hívható telefonszámunk:

A legközelebbi kontrollvizsgálat időpontja:

Kezelőorvosa: