



INVAZÍV BEAVATKOZÁS (MŰTÉT) BETEGTÁJÉKOZTATÓJA

Alulírott (név) (szül. idő) kijelentem, hogy dr. (orvos neve) engem, illetve hozzátartozómat (..... név, szül. idő, rokonsági fok) az alábbi invazív beavatkozásról a következők szerint kellő mértékben és módon tájékoztatott:

MÉHKAPARÁS (FRACTIONALT CURETTAGE)

- Az invazív beavatkozás (műtét, vizsgálat) megnevezése:** A fractionalt curettage a méhnyálkahártya mind jóindulatú, mind rosszindulatú betegségeinek diagnosztizálására és bizonyos esetekben egyben kezelésére alkalmazott műtét. Leginkább nőgyógyászati küret, egészségügyi küret, illetve „kaparás” néven ismert.
- A beavatkozás célja:** Rendellenes méhvérvetések esetén a diagnózis felállításának egyik módszere. A méhnyak és a méhüreg nyálkahártyájának eltávolítását jelenti, szövettani feldolgozás céljából. A rendellenes méhüregi vérzés okának tisztázására és azok megszüntetésére szolgál a fractionalt curettage. A vérezszavar hátterében a hormonrendszer zavara, gyulladós folyamat, valamint jó- és rosszindulatú szövetburjánzás is állhat. A páciens kórtörténete és életkora lényeges támpont a betegség jellegére vonatkozóan, de a küret során eltávolított szövetminta mikroszkópos vizsgálata adja meg a biztos diagnózist. Ennek alapján derül ki, hogy egy ártalmatlan hormonális zavar vagy kezelést igénylő, komoly elváltozás áll-e fenn. A szövettani vizsgálatok alapján lehet eldönteni, hogy milyen további kezelés szükséges. A rosszindulatú méhnyálkahártya betegség (endometrium carcinoma) esetén az egyetlen figyelmeztető jel a menopausa körüli vagy utáni vérezszavar lehet. Emiatt fontos rendellenes vérzés esetén nőgyógyásznál jelentkezni. Rendellenes vézéről akkor beszélünk, ha a vérzés nem a menstruáció várt idejében jelentkezik, illetve a menopausa utáni vézéseket mindig rendellenesnek tartjuk, akkor is, ha nem volt bő vagy elhúzódó.
- A beavatkozás menete, technikája:** Miután megszületett a döntés az egészségügyi küret szükségességéről, azt kell vizsgálni, hogy a páciens operálható-e, illetve szükséges-e bármilyen előkészítés a műtéthez. Erről altatóorvosi vizsgálat dönt laboratóriumi leletek, EKG vizsgálat esetleg egyéb kiegészítő vizsgálatok segítségével. Az egészségügyi küretműtét amennyiben nincs társult betegség, akkor a beavatkozás az egynapos sebészet keretein belül elvégezhető. Ez azt jelenti, hogy a beteg a műtét után, pár órás megfigyelést követően, de 24 órán belül az otthonába távozhat. A beavatkozás történhet rövid intravénás altatásban, vagy helyi érzéstelenítésben. A beavatkozás során két külön helyről nyerünk kaparékot: a méhnyakból és a méhtestből. Ezután mindkettőt kórszövettani vizsgálatra küldjük.
Méhkaparás utáni teendők: Altatásban végzett műtétet követően 5-6 órával, amennyiben szövődmény nem lépett fel, és a beteg is jól érzi magát, otthonába távozhat. A műtét utáni napon a betegek többsége folytathatja mindennapi aktivitását. Az átlagos gyógyulási idő 2-4 nap, ezalatt az idő alatt a nagy megterhelést kerülni kell. A gyulladós megbetegedés elkerülése céljából, legalább két hétig tartózkodni kell a szexuális élettől. Javasolt még a tamponhasználat, hüvelyöblítés és az ülőfürdő elhagyása két-három hétig. Műtét után általában két héttel készül el a szövettani lelet, amiért jelentkezni kell a szakrendelésen! Ez nagyon fontos, hiszen a további teendők felől is ekkor döntenek. A teljes gyógyulást követően 4-6 héttel nőgyógyászati kontrollvizsgálat szükséges.
- A beavatkozás esetleges veszélyei, szövődményei és ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:** A leggondosabb orvosi beavatkozás ellenére is kialakulhatnak szövődmények. A méhkaparásnál a legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy a méhfalat vékony műszerrel akaratlanul átszúrják. Ez a szövődmény többnyire veszélytelen, és nem mindig igényel további beavatkozást, csak megfigyelést. Nagyobb sérülés, vagy hasúri vérzés esetén hasi tükrözés (laparoscopia), vagy hasműtét (laparotomia) végzése jön szóba. Egyéb szövődmények lehetnek az utóvérzés, illetve a gyulladás, melyek azonban jól kezelhetők. Az egészségügyi küret során előforduló leggyakoribb szövődmény a méhüri gyulladás, ennek továbbterjedése esetén a kismedencét is érintheti. A gyulladás jelei lehetnek a műtétet követően 2-3 napnál is tovább tartó vérzés, mely bűzössé válik, vagy véres



hüvelyi folyás, alhasi fájdalom, hőemelkedés, esetleg láz is jelentkezhet. Bármely tünet észlelése során azonnal forduljon operáló orvosához, hogy a célirányos kezelést minél hamarabb megkezdhessék.

- 5. Ezen beavatkozás elmaradásának, elutasításának esetleges veszélyei:** A terápiás célú méhkaparás elmaradása vérzést, vérszegénységet, elvérzést eredményezhet. A beavatkozás mellőzése esetén nem kapunk információt a szövettani elváltozásokról (adott esetekben rosszindulatú megbetegedésekről).
- 6. Más beavatkozási lehetőségek, alternatívák:** Gyógyszeres vérzés csökkentés esetén a betegség oka nem derül ki. Vacumos méh-nyálkahártya kiszívás vagy csik-kürett esetén - csak diagnosztikus eljárásaként alkalmazhatók - a szövettani kóros állapotok nem minden esetben fedezhetők fel.
- 7. Fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az ezekre kapott válaszok:**

INVAZÍV BEAVATKOZÁS (MŰTÉT) BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsék és válasszak a megismert kezelések közül.

Tájékoztattak arról, hogy szakszerű, a szakma szabálya szerinti gyógykezelés esetén is előfordulhatnak előre nem várható szövődmények, melyek a várható gyógyeredményt (gyógytartamot) kedvezőtlenül befolyásolhatják. Tájékoztattak arról, hogy a kórházi kezelés (kivizsgálás, gyógyszeres kezelés, műtét, egyéb fent részletezett kezelés) elutasítása, a gyógykezelés megszakítása, illetve annak meghatározott vagy meghatározatlan idejű halasztása kockázattal jár.

Megértem és tudomásul veszem azt is, hogy kivizsgálásom és kezelése során tanulónővérek, orvostanhallgatók, szakorvosjelöltek esetleges jelenléte és közreműködése a képzés és továbbképzés elengedhetetlen velejárója.

Tudomásul veszem, hogy jogom van bármikor a felajánlott kezelése elutasítására. Ez esetben a kezelése során, a visszautasítás kapcsán jelentkező következményekért, szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a javaslatát, kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem.

Ezen nyilatkozat aláírásával

*beleegyzem és kérem **

*nem egyezem bele és nem kérem **

a fenti beavatkozás elvégzését.

Nyilatkozatomat a tájékoztatás megértése alapján minden kényszerből és befolyástól mentesen adom.

Jelen beleegyző nyilatkozat az F-B-04. „Általános beleegyző nyilatkozat” vagy az „Ambuláns kezelőlap” aláírásával együtt érvényes.

Szombathely, 20 év hó nap óra perc

.....
orvos aláírása

.....
beteg vagy törvényes képviselő aláírása

*A megfelelő válasz egyértelműen (aláhúzás, bekarikázás) jelölendő.