

INVAZÍV BEAVATKOZÁS (MŰTÉT) BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Alulírott (név) (szül. idő)
kijelentem, hogy dr. (orvos neve) engem, illetve hozzátartozómat
(..... név, szül. idő,
rokonsági fok) az alábbi betegségről, műtéti kezeléséről, invazív beavatkozásról a következők szerint kellő
mértékben és módon tájékoztattott.

ESZTÉTIKAI MŰTÉT FÜLÖN

1. Az invazív beavatkozás (műtét, vizsgálat) megnevezése: Esztétikai céllal a fülön végzett leggyakoribb műtét annak alaki vagy nagyságbeli korrekciója, átalakítása. A leggyakoribb ezek közül is az elálló fül probléma műtéte, amikor a fül síkja a koponya csont síkjával tompa (60 foknál nagyobb) szöveget zár be. A műtét során szükség lehet antihelix képzésre "lapátfül" deformitas esetén, amelynek lényege egy porcos hajlat kialakítása a fül peremét képező porcos széllel (helix) párhuzamosan.

A fül nagyságát változtató műtétek a fennálló esztétikai panasz jellegétől függően a fül különböző részeit érinthetik, általában porc és bőr együttes eltávolításával járnak, gyakran alaki változást is eredményeznek, vagy a fül alakját is változtató műtéttel egészíthetők ki.

2. A beavatkozás célja, menete, technikája:

Elálló fül esetén:

A fül hátsó felszínén babérlevél alakú bőrt távolítunk el, majd meghatározzuk és eltávolítjuk a porcos többletet, amely az alap problémát okozza. A bőr sebét varrattal zárjuk, amely varratot két öltéssel tehermentesítünk. A műtét végén egy speciális kötést helyezünk mindkét fülre, amelynek a varratszedésig, tehát egy hétig a műtétet követően helyén kell maradnia!

Lapátfül esetén:

A fent említett hátsó feltárásból meghatározzuk a tervezett porcos hajlat szélességi és hosszirányú kiterjedését. Ilyenkor további metszést ejtünk a fül elülső felszínén a helix felső (proximalis) hajlata alatt. Innen alápreparáljuk a bőrt a fül elülső felszínén, majd itt a porcfelszínt, a tervezett hajlításnak megfelelően irdaljuk. Ezt követően a porcot meghajlítjuk és öltéssel rögzítjük.

3. A beavatkozás esetleges veszélyei, szövődményei és ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:

- Általánosságban elmondható, hogy a két fül soha nem egyforma teljesen, nem is várható, hogy a műtétet követően teljesen egyforma legyen alak és méret szempontjából egyaránt.
- A műtéti heg végleges kialakulása 1 évvel a műtétet követően várható. Előfordulhat kedvezőtlen, vastag, akár a műtéti metszés határait nem respektáló heg képződése is, amely a későbbiekben csak korlátozottan vagy egyáltalán nem befolyásolható. Mindez főleg a fülcimpa területén gyakori.
- A porcon végzett műtétek, a fül porcos vázából történő porc részlet eltávolítása, akár alaki, akár nagyságbeli változtatás céljából történik, meggyengítheti a fül porcos vázát, amely miatt az sérülékenyebb lehet a műtétet követően, akár viszonylag kisebb sérülés, trauma hatására el is törhet. Az így eltört porc okozhat alaki deformitást, amely nem minden esetben korrigálható, vagy a korrekció csak további hegek és műtéti sebek árán lehetséges.
- Bár a fül vérellátása nagyon jó, a műtéti beavatkozások kapcsán előfordulhat, hogy kisebb-nagyobb területen a fül porcos vázátfedő bőr vérellátása károsodik, ennek kapcsán egy bőrrészlet akár el is halhat (necrotical). Az így károsodott bőrtérület gyógyulhat nagyobb heggel, vagy esetenként más testtájékról vett bőrral történő pótlásra is szükség lehet.

Folytatás a túloldalon!

- A fület védő kötés idő előtti eltávolítása kapcsán a fül bevérézhet, a vér szervülése miatt szabálytalan formájú, amorf fül alakulhat ki, amelynek korrekciója esetenként csak teljes fül pótlással érhető el, amely során csak az eredetihez méretben és formában közelítő, de nem azonos fül képezhető.

4. Fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az ezekre kapott válaszok:

5. Egyénre szabott betegtájékoztató:

INVAZÍV BEAVATKOZÁS (MŰTÉT) BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek és válasszak a megismert kezelések közül. Tájékoztattak arról, hogy szakszerű, a szakma szabálya szerinti gyógykezelés esetén is előfordulhatnak előre nem várható szövődmények, melyek a várható gyógyeredményt (gyógytartamot) kedvezőtlenül befolyásolhatják. Tájékoztattak arról, hogy a kórházi kezelés (kivizsgálás, gyógyszeres kezelés, műtét, egyéb fent részletezett kezelés) elutasítása, a gyógykezelés megszakítása, illetve annak meghatározott vagy meghatározatlan idejű halasztása kockázattal jár.

Megértem és tudomásul veszem azt is, hogy kivizsgálásom és kezeléseim során tanulónővérek, orvostanhallgatók, szakorvosjelöltek esetleges jelenléte és közreműködése a képzés és továbbképzés elengedhetetlen velejárója.

Tudomásul veszem, hogy jogom van bármikor a felajánlott kezelések elutasítására. Ez esetben a kezeléseim során, a visszautasítás kapcsán jelentkező következményekért, szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a javaslatát, kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem.

Ezen nyilatkozat aláírásával

*beleegyezem és kérem **

*nem egyezem bele és nem kérem **

a fenti beavatkozás elvégzését.

Nyilatkozatomat a tájékoztató megértése alapján minden kényszertől és befolyástól mentesen adom.

Jelen beleegyző nyilatkozat az **F-B-04.** „Általános beleegyző nyilatkozat” vagy az „Ambuláns kezelőlap” aláírásával együtt érvényes.

Szombathely, 20 év hó nap óra perc

.....
orvos aláírása

.....
beteg vagy törvényes képviselő aláírása

*A megfelelő válasz egyértelműen (aláhúzás, bekarikázás) jelölendő.