



INVAZÍV BEAVATKOZÁS BETEGTÁJÉKOZTATÓJA

NŐGYÓGYÁSZATI SZERVEK KÖZELTERÁPIÁS SUGÁRKEZELÉSE

Előkészületek

Különböző vizsgálatokkal pontosan meg kell állapítanunk a daganat kiterjedését, a szervezet egészéhez való viszonyát (Rtg, Ultrahang, CT, MRI segítségével).

A társbetegségek és különböző biológiai tényezők mérlegelése után egy szakértői orvoscsoport kidolgozza az erre az esetre legkedvezőbb kezelési tervet, amelynek része a sugárterápia is.

Gyakran alkalmazunk a védelme érdekében megtervezett ólomárnyékolást. Ezek a tényezők biztosítják a kezelés sikerét és garantálják a mellékhatások csökkenését.

A sugármennyiséget (dózis), a besugárzás idejét és a szükséges kezelések számát az orvos és a fizikus közösen határozza meg.

Ha a sugárkezelés megtervezéséhez röntgen kontrasztanyag szükséges, ritkán allergiás reakciók léphetnek fel. Súlyos, életveszélyes esetek azonban nagyon ritkán fordulnak elő.

A kezelés menete

Az asszisztens lefekteti a beteget a nőgyógyászati műtőasztalra, ezután a kezelőorvos, ha szükséges, helyi érzéstelenítő injekciót ad, majd bevezeti a hüvelybe/nyakcsatornába/méhüregbe a kezelőeszközt, melynek a helyzetét röntgen készülékkel ellenőrzi. A kezelés ideje alatt maradjon végig nyugodt és lehetőség szerint lazuljon el ugyanabban a helyzetben.

A sugárzás maga fájdalommentes, pár percet-negyed óra időtartamot vesz igénybe.

Milyen kísérő kezelésekre kell számítani?

Hogy az általános állapotát megfelelő szinten tarthassuk, valamint hogy a mellékhatásokat a körülményekhez képest a legjobban csökkentsük, további gyógyszerek, injekciók, infúziók alkalmazása válhat szükségessé.

Mit tehet Ön a kezelés sikere érdekében?

Minden egyes sugárkezelés után hosszabb ideig kell pihennie, a legjobb a friss levegőn. Ügyeljen az elegendő és kiegyensúlyozott táplálkozásra. A legjobb, ha gyakran és keveset eszik. Mellőzze a zsíros, nehezen emészthető, puffasztó hatású ételeket. Mi fehérjét és szénhidrátot ajánlunk. Igyon sok folyadékot és szánjon elegendő időt az étkezésre!

Hogy a mellékhatásokat a lehető legcsekélyebbre csökkentsük:

Vegyen részt lelkiismeretesen az előírt utókezeléseken, vér- és röntgen vizsgálatokon. Kérdezze az orvosát, hogy Ön mit tehet a gyógyulási folyamat érdekében.

Milyen mellékhatások jelentkezhetnek?

- Ritkán fejfájás, enyhe rosszullét, hányinger, hányás, vagy fáradtság jelentkezhethet.
- A puffadás, hasmenés gyakori kísérő tünet, akár tartósan is fennáll.
- Nagyon ritkán vérzés, nyákürülés jelentkezhethet.
- Előfordulhat gyakoribb vizelési inger, fájdalmas vizelés, húgycsőégés. Ilyen jellegű panaszokon is tudunk gyógyszeresen segíteni, ezért kérjük, jelezze kezelőorvosának, ezen kívül tanácsolt a bő folyadékfogyasztás.



Milyen szövődmények léphetnek fel?

- Méhúri kezeléseknél a méhfal sérülése, perforációja előfordulhat.
- Méhúri beavatkozás után erős alhasi fájdalmak jelentkezhetnek, melyek fájdalomcsillapítók alkalmazását tehetik szükségessé.
- Számolni kell a vérzés fokozódásával.
- Hólyagsérülés, belek sérülése lehetséges.
- A hüvely és a szeméremtest közelterápiás kezelése nyálkahártya-gyulladást, kifelégyesedést, bőrgyulladást okozhat.
- Vizelettartási zavarok (inkontinencia) lehet a kezeléseknél következménye.
- A széklethabitus megváltozhat, elsősorban hasmenés léphet fel.
- A daganatos betegeknél a kezeléseknél vagy után sipolyok alakulhatnak ki (hüvely-hólyagsipoly, hüvely-végbélsipoly).
- Ritkán a bélkacsok tartós szűkülete, összetapadása, kivételesen ritkán helyi nekrozis (a bélfali szövetek pusztulása, fekély) alakulhat ki.

Speciális vizsgálatok, beavatkozások szövődmények gyanúja, illetve szövődmény esetén

- A méh sérülése nyílt hasi műtétet tesz szükségessé.
- A hólyag, illetve a húgyvezeték sérülésekor urológiai beavatkozás válhat indokolttá.
- Csillapíthatatlan vérzés esetén az ellátó ér embolizációjára (lezárására) lehet szükség.
- Nyálkahártya-gyulladás, bőrgyulladás esetén bőrgyógyászati konzíliumra lehet szükség.
- Erős fájdalom esetén akár kábító fájdalomcsillapító adása indokolt.
- Erős vérzés okozta vérvesztésnél vérvérvétel vérvérvétel adását teheti szükségessé.